

Ką turėčiau žinoti apie Xarelto?

- ◆ Xarelto suskystina kraują, o tai apsaugo nuo pavojingų kraujo krešulių susidarymo.
- ◆ Xarelto reikia vartoti tiksliai kaip nurodė gydytojas. Kad geriausiai apsaugotumėte nuo kraujo krešulių susidarymo, **niekada nepraleiskite dozės.**
- ◆ Negalima nustoti vartoti Xarelto prieš tai nepasitarus su gydytoju, nes gali padidėti kraujo krešulių susidarymo rizika.

- ◆ Jeigu vartojate, neseniai vartojote ar ketinate pradėti vartoti kitų vaistų, prieš pradėdami vartoti Xarelto apie tai pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui.
- ◆ Prieš atliekant bet kokią chirurginę ar invazinę procedūrą, savo sveikatos priežiūros specialistui pasakykite, kad vartojate Xarelto.

Kada turėčiau kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą?

Vartojant kraują skystinantį vaistą Xarelto, svarbu žinoti, koks yra jo šalutinis

poveikis. Dažniausias šalutinis poveikis yra kraujavimas. Jei žinote, kad Jums yra kraujavimo rizika, negalima pradėti vartoti Xarelto, prieš tai nepasitarus su gydytoju. Nedelsdami pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui, jeigu pasireiškia tokie kraujavimo požymiai arba simptomai:

- ◆ skausmas,
- ◆ tinimas arba nemalonus jausmas,
- ◆ galvos skausmas, galvos svaigimas arba silpnumas,
- ◆ neįprastos mėlynės, kraujavimas iš nosies, kraujavimas iš dantenu, ilgai nepraeinantis kraujavimas įsipjovus,
- ◆ gausėnis nei įprastai mėnesinių kraujavimas arba kraujavimas iš makšties,

- ◆ kraujas šlapime, kuris gali būti rausvos arba rudos spalvos, raudonos arba juodos spalvos išmatos,
- ◆ kraujo atkosėjimas arba vėmimas krauju ar į kavos tirščius panašiu skrandžio turiniu.

Kaip vartoti Xarelto?

- ◆ Norint užtikrinti optimalią apsaugą, Xarelto
 - 2,5 mg tabletes galima vartoti valgio metu arba nevalgius;
 - 10 mg tabletes galima vartoti valgio metu arba nevalgius;
 - 15 mg tabletes reikia vartoti valgio metu;
 - 20 mg tabletes reikia vartoti valgio metu.

86668130 LT

Paciento budrumo kortelė



- Xarelto® 2,5 mg
- Xarelto® 10 mg
- Xarelto® 15 mg
- Xarelto® 20 mg

- ◆ **Visada turėkite šią kortelę.**
- ◆ **Parodykite šią kortelę kiekvienam gydytojui arba odontologui prieš paskiriant Jums gydymą.**

Aš vartoju antikoagulantą Xarelto (rivaroksabaną)

Vardas, pavardė:

Kiti vaistai / būklės:

Adresas:

Gim. data:

Svoris:

Skubos atveju praneškite:

Gydytojo v., pavardė:

Gydytojo tel.:

Gydytojo antspaudas:

Taip pat praneškite:

Vardas, pavardė:

Telefonas:

Giminystės ryšys:

Informacija sveikatos priežiūros specialistams:

- ◆ TNS reikšmių nustatyti nereikia, nes tai nėra patikimas tyrimo metodas Xarelto antikoaguliaciniam aktyvumui įvertinti.

Xpc005Aug2018



L.T. 6